

®

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES



DLP 16-06-89 148567

Arboriculture

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes DRAF Rhône-Alpes

Bulletin n° 11 - 14 Juin 1989

Tavelures du pommier et du poirier : toujours des projections....
Oïdium du pommier : observez attentivement vos vergers
Psylle du poirier : limitez les traitements avec l'amitraz
Carpocapse des pommes et des poires : légère intensification du vol
Tordeuse Orientale du Pêcher : fin du premier vol
Pou de San José : sortie des larves dans tous les secteurs

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Bien que le stock de spores projetables diminue, les risques de contamination persistent, aussi nous vous conseillons de maintenir une protection préventive.

RUGOSITE SUR GOLDEN

La période de sensibilité est terminée, aussi il n'est plus nécessaire d'appliquer des produits tel que l'Epargol. Dans les vergers de golden où des taches de tavelure sont présentes poursuivez la protection avec du captane.

OIDIUM DU POMMIER

Sur la variété IDARED 3 à 5 % des pousses sont oïdiées. Dans les vergers mixtes IDARED - GOLDEN, l'oïdium est présent sur les deux variétés.

Dans ces plantations il est nécessaire de maintenir la protection.

Produits utilisables :

soufre	: 500 g de ma/hl	Nombreuses spécialités
bupirimate	: 15 g de ma/hl	NIMROD
pyrazophos	: 30 g de ma/hl	AFUGAN CE
triadiméfon	: 5 g de ma/hl	BAYLETON 5. Ce produit étant un inhibiteur de la biosynthèse de l'ergostérol, limitez son utilisation à 3 ou 4 utilisations durant cette année.

PSYLLE DU POIRIER

La situation varie selon les vergers. Dans les plantations peu infestées, il est inutile d'intervenir.

En présence de miellat, effectuez soit une irrigation, soit une pulvérisation avec de l'eau plus du TEEPOL (0,3 l/hl).

Actuellement, une forte proportion de larves âgées est présente, aussi une application à base d'amitraz (TUDY - MAITAC) n'aurait qu'une efficacité limitée.

P654

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES

Légère intensification du vol depuis le 11 Juin.

Dans la région lyonnaise quelques oeufs ont été déposés le 1er et le 7 Juin ; une ponte plus importante a été observée le 11 Juin.

En Haute-Savoie, les pontes ont débuté le 11 Juin.

Si vous utilisez des produits ovicides (DART - DIMILIN - INSEGAR) renouvelez l'application 3 semaines plus tard.

Si vous intervenez avec des produits larvicides les traitements seront renouvelés :

- entre le 16 et le 18 Juin pour le sud de la Drôme, le Bas-Vivarais et la région valentinoise.
- entre le 18 et le 20 Juin pour le nord de la Drôme et de l'Ardèche, l'Isère et la région lyonnaise et la Loire.
- Pour les Savoies et l'Ain, si vous êtes intervenus entre le 7 et le 11 Juin prévoyez un renouvellement aux alentours des 28 Juin.

Si vous subissez une pluie de plus de 20 mm, renouvelez votre application le plus tôt possible.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHEUR

Fin du premier vol.

Pour les variétés qui seront récoltées d'ici 20 jours, il est inutile d'intervenir.

Pour les variétés qui seront cueillies aux alentours de la mi-Juillet, il est encore trop tôt pour intervenir.

Produits utilisables :

deltaméthrine	: 1,75 g de ma/hl	DECIS
fénitrothion	: 50 g de ma/hl	Nombreuses spécialités
fenpropathrin	: 10 g de ma/hl	DANITOL
fenvalérate	: 7,5 g de ma/hl	SUMICIDIN
fluvalinate	: 14,4 g de ma/hl	KLARTAN
méthidathion	: 40 g de ma/hl	ULTRACIDE 20 bouillie
méthomyl	: 75 g de ma/hl	LANNATE 20 L - METOVER
phosalone	: 60 g de ma/hl	ZOLONE FLO
fenvalérate + fénitrothion	: 0,075 l de ma/hl	SUMICOMBI

OIDIUM DU PECHEUR

Dans certains vergers des taches sont présentes sur fruits, dans ce cas la protection doit être maintenue.

MONILIA SUR PECHEES, ABRICOTS ET CERISES

Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables au développement de cette maladie, aussi un traitement 20 à 15 jours avant récolte est suffisant.

Produits utilisables :

bénomyl	30 g de ma/hl	BENLATE	sans délai avant récolte
carbendazime	30 g de ma/hl	Nombreuses spécialités	sans délai avant récolte
iprodione	75 g de ma/hl	KIDAN - ROVRAL	délai : 24 jours avant récolte
procymidone	75 g de ma/hl	SUMISCLEX	délai : 8 jours avant récolte
vinchlozoline	50 g de ma/hl	RONILAN	sans délai avant récolte

MOUCHE DE LA CERISE

Le vol se poursuit, maintenez la protection sur toutes les variétés non récoltées à ce jour.

Si vous utilisez du diméthoate arrêtez les traitements 7 jours avant récolte.

PETITE MINEUSE DE L'ABRICOTIER (Anarsia)

Vol d'intensité moyenne dans la région valentinoise.
Sur la variété Bergeron débutez la lutte cette semaine.

Produits utilisables :

ZOLONE : 0,12 l/hl

KLARTAN : 0,06 l/hl

TOUS ARBRES FRUITIERS

POU DE SAN JOSE

L'essaimage des larves est en cours dans tous les secteurs, dans les vergers contaminés, effectuez une pulvérisation avec de l'ULTRACIDE (200 g/hl) dès cette semaine.

Sur pêchers utilisez l'ULTRACIDE 20 Bouillie.

PUCERONS

Des colonies de pucerons sont toujours signalées sur pommiers, pêchers et cerisiers. Observez vos vergers avant d'intervenir.

ACARIENS ROUGES

Les populations se développent lentement ; dans les vergers traités au printemps avec des ovicides ou des larvicides-adulticides il n'est pas nécessaire d'intervenir pour le moment.



Le service de la protection des végétaux et le journal
"LA FRANCE AGRICOLE" s'unissent pour vous proposer :

Les Avertissements Agricoles sur Minitel

36.15 code FA3

- Grandes cultures	PVRACULT
- Arboriculture	PVRAARBO
- Viticulture	PVRAVITI

